


PHẪU THUẬT ĐỤC THỦY TINH THỂ

<p>Đục thủy tinh thể là gì??</p>	 <p>Đục thủy tinh thể là tình trạng thủy tinh thể bị mờ đục, cản trở ánh sáng đi qua dẫn đến suy giảm thị lực. Nguyên nhân thường xảy ra do lão hóa, nhưng cũng có thể do bẩm sinh hoặc các yếu tố khác như chấn thương, sử dụng thuốc, bệnh lý đái tháo đường, Các triệu chứng phổ biến bao gồm nhìn mờ, màu sắc không còn sắc nét, chói sáng.</p>
<p>Phương pháp phẫu thuật</p>	<p>Phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể bằng siêu âm có đặt kính nội nhãn (PHACO)</p>
<p>Khám đánh giá trước phẫu thuật</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đo mạch, huyết áp, nhiệt độ - Đo thị lực, nhãn áp - Bác sĩ điều trị khám, chẩn đoán, cho chỉ định phẫu thuật, tư vấn chọn kính nội nhãn - Bác sĩ giám đốc khám, duyệt mổ
<p>Xét nghiệm</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy laser) - Tổng phân tích nước tiểu (bằng máy tự động) - Điện tim - Đo công suất kính nội nhãn - Đếm tế bào nội mô giác mạc - Siêu âm mắt - Chụp cắt lớp võng mạc (khi có chỉ định) - Bơm rửa lệ đạo
<p>Thuốc trước mổ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nhỏ thuốc trước mổ (giãn đồng tử, kháng sinh, kháng viêm)
<p>Chuẩn bị hồ sơ trước phẫu thuật</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Xác nhận đúng người bệnh, đúng mắt, đúng loại phẫu thuật - Ghi thông tin vào hồ sơ bệnh án - Thân nhân hoặc người bệnh ký cam đoan phẫu thuật
<p>Phẫu thuật</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Xác nhận lại thông tin người bệnh - Chuyển người bệnh vào phòng mổ - Phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể bằng siêu âm có đặt kính nội nhãn
<p>Theo dõi sau phẫu thuật</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nghỉ ngơi tại buồng bệnh 30 phút - Đo mạch, huyết áp, nhiệt độ - Theo dõi tình trạng mắt: đau nhức, chảy dịch

Thủ tục xuất viện	<ul style="list-style-type: none">- Thân nhân hoặc người bệnh ký bảng kê chi phí điều trị- Trả BHYT- Phát thuốc, kính bảo hộ, giấy ra viện
Thuốc và tái khám sau mổ	<ul style="list-style-type: none">- Giảm đau Paracetamol 500mg uống sáng 1 viên, tối 1 viên- Kháng sinh nhỏ 8 lần/ngày, cách 2 tiếng nhỏ 1 lần- Kháng viêm 8 lần/ngày, cách 2 tiếng nhỏ 1 lần- Không cho nước vào mắt mổ 7 ngày- Tái khám sau 1 hoặc 2 ngày